

Neuropatia Periférica

Chiara Beletato

Neuropatia Periférica

- Neuropatia
 - Polineuropatia
 - Acometimento bilateral SIMÉTRICO
 - Guillain – Barre/ Alcoólica / Diabetes
 - Mononeuropatia
 - Acometimento de 1 nervo
 - **Hanseníase/ diabetes
 - Mononeuropatia múltipla
 - Acometimento assimétrico
 - Ex: braço direito + perna esquerda
 - Vasculite/ Diabetes/ Hanseníase

NERVO MEDIANO

- MONONEUROPATIA

- Neuropatia do nervo MEDIANO

- Função:

- flexão dos três primeiros dedos da mão e a oponência do polegar.

- Sensibilidade

- três primeiros dedos até metade do 4º dedo

NERVO MEDIANO



NERVO MEDIANO

- Clínica
 - Dor
 - Parestesia no território sensitivo
 - “dormência/ formigamento”
 - **Mão em benção.**




NERVO MEDIANO

- Neuropatia específica do nervo mediano
 - Síndrome do túnel do carpo
 - Compressão no punho
 - Dor,
 - Parestesia que piora à noite
 - Teste de Phalen e Sinal de Tinel

NERVO MEDIANO

Phalen's test



NERVO MEDIANO



NERVO ULNAR

- Neuropatia do nervo ulnar
 - Funções
 - Flexão do punho, flexão das falanges proximais dos 4^a e 5^o dedos.
 - Sensibilidade – metade do 4 dedo até o 5 dedo.

NERVO ULNAR



NERVO ULNAR

– Clínica

- Dor, parestesia no território sensitivo e pode ter a mão em garra.



NERVO RADIAL

- Neuropatia do nervo radial
 - Função
 - Extensão da mão, do antebraço, dos dedos.
 - Sensibilidade da metade dorsal da mão e dorsal do polegar



NERVO RADIAL

- Clínica: dor, parestesia no território sensitivo e mão caída (gota)



NEUROPATIA DIABÉTICA

- Neuropatia diabética
 - Tipo mais comum
 - Polineuropatia distal sensitivo – motor (bota e luva)
 - Nervo periférico mais acometido
 - Mediano
 - Par craniano mais acometido
 - **III***, IV e o VI / **VII**
 - Lesão III par
 - » Ptose, estrabismo divergente

NEUROPATIA DIABÉTICA



NEUROPATIA DIABÉTICA

- Neuropatia diabética
 - Tipo mais comum
 - Polineuropatia distal sensitivo – motor (bota e luva)
 - Nervo periférico mais acometido
 - Mediano
 - Par craniano mais acometido
 - Oculomotor (III) / Facial (VII)
 - **Lesão III par**
 - » Ptose, estrabismo divergente
 - » **Ausência de midríase**
 - **poupa fibras parassimpáticas**

NEUROPATIA DIABÉTICA

– Par craniano mais acometido

- Oculomotor (III) / Facial (VII)

- **Lesão III par**

- » Ptose, estrabismo divergente

- » **Ausência de midríase (poupa fibras parassimpáticas)**

- **LESÃO VII PAR**

- » Paralisia facial completa (testa, olho e boca)



